TEST PITANJA IZ SPECIJALNE HIRURGIJE

Pitanje broj 1
Tercijerno zarašćivanje rane (*sanatio per terciam intentionem*) je:
_____
(zarašćivanje rane pomoću transplantata)

Pitanje broj 2
Podvodna drenaža po Bullauu koristi se kod:
a) konkvasacionih povreda mekih tkiva ekstremiteta i kod hirurškog zahvata u lečenju osteomijelitisa
b) drenaže trbušne duplje
c) drenaže manjih gnojnih rana
d) drenaže pleuralnog prostora D

Pitanje broj 3
Serumski PSA antigen služi za otkrivanje
a) ehinokoka pluća
b) benigne hiperplazije prostate
c) adenokarcinoma prostate C
d) karcinoma pluća

Pitanje broj 4
Toksični megakolon predstavlja komplikaciju
_____
(akutnog fulminantnog kolitisa-nekrotizujuće zapaljenje glatke muskulature)

Pitanje broj 5
Mezenterna apopleksija predstavlja:
_____
(spontana ruptura mezenternih krvnih sudova)

Pitanje broj 6
Stres-inkontinencija je:
a) nemogućnost zadržavanja mokraće kod stresa
b) nemogućnost zadržavanja mokraće
c) nemogućnost zadržavanja mokraće pri naporu C
d) nemogućnost mokrenja

Pitanje broj 7
Komplikacije Kronove bolesti su:
_____
(opstrukcija, perforacija, krvarenje, fistule, apscesi)

Pitanje broj 8
Koje su karekteristike opšte anestezije?
_____
(analgezija, gubitak svesti, mišićna relaksacija i arefleksija)

Pitanje broj 9
Insulinom je tumor
a) ćelija egzokrinog dela pankreasa
b) B ćelija Langerhansovih ostrvaca B
c) A ćelija Langerhansovih ostrvaca
d) ćelija egzokrinog i endokrinog pankreasa

Pitanje broj 10
Periorbitalni hematom je karakterističan
a) kod preloma zadnjeg sprata baze lobanje
b) kod impresivnih fraktura svoda lobanje
c) kod preloma prednjeg sprata baze lobanje C
d) kod svih preloma lobanje sa epiduralnim hematomom

Pitanje broj 12
Centralni venski pritisak zavisi od?

_____
(srčane pumpe, cirkulišuće zapremine krvi i tonusa krvnih sudova)

Pitanje broj 13
Koja se zapaljenja odlikuju bujanjem tkivnih elemenata ?

_____
(proliferativna zapaljenja)

Pitanje broj 14
Vulnus morsum viperinum predstavlja ranu nanetu ujedom:

a) psa
b) zmije B
c) konja
d) mačke

Pitanje broj 15
Myositis ossificans predstavlja:

_____
(kasnu komplikaciju preloma kao posledicu metaplastičnog okoštavanja mišića i osificiranja hematoma)

Pitanje broj 16
Punkciju mokraćne bešike izvodimo:

a) na Monro-Richterovoj liniji
b) u Lancovoj tački
c) medijalno dva prsta iznad simfize C
d) u blizini pupka

Pitanje broj 17
Topikalna anestezija se postiže:

a) aplikacijom anestetika na površinu A
b) infiltracijom lokalnog anestetika na mestu operacije
c) ubrizgavanjem anestetika u blizinu nervnog stabla ili pleksusa
d) intravenskim ubrizgavanjem anestetika

Pitanje broj 18
Kod preloma zadnjeg sprata baze lobanje karakteristični simptom je:

a) otoreja
b) pojava likvora kroz nos
c) pojava likvora u ždrelu C
d) hematom u vidu naočara

Pitanje broj 19
Kod periapendikularnog infiltrata lečenje je

_____
(medikamentozno-antibiotici)

Pitanje broj 20
Kod koje povrede grudnog koša dolazi do paradoksalnih pokreta grudnog koša (uvlačenje grudnog koša u inspirijumu i izbočenje u ekspirijumu)?

_____
(torakalni kapak)

Pitanje broj 21
Blair I transplntat predstavlja

_____
(kožni transplantat debljine ½ kože)

Pitanje broj 22
Kod Richterove hernije postoji:

_____
(inkarceracija zida creva bez kompletne opstrukcije)

Pitanje broj 23
Znak iliopsosa (Krigerov znak) je pozitivan kod akutnog apendicitisa
a) retrocekalne lokalizacije A
b) pelvične lokalizacije
c) subhepatične lokalizacije
d) mediocekalne lokalizacije

Pitanje broj 24
Šta je Galeacijev prelom (*Fractura Galeazzi*)
_____
(predstavlja prelom radijusa u distalnoj trećini uz luksaciju glavice ulne u distalnom radioulnarnom zglobu)

Pitanje broj 25
Intermitentna klaudikacija sa bolovima i grčrvima u mišićima nogu pri opterećenju važan je simptom:
a) tromboembolija arterija donjih ekstremiteta
b) proširenih vena donjih ekstremiteta
c) hroničnih okluzija arterija donjih ekstremiteta C
d) tromboze dubokih vena donjih ekstremiteta

Pitanje broj 26
Šta je koarktacija aorte?
_____
(kongenitalno suženje početnog dela descedentne aorte)

Pitanje broj 27
Za koje hernije kažemo da su ventralne ili incizione?
_____
(hernije koje nastaju na mestu prethodnih operacija-rezova)

Pitanje broj 28
Šta je Monteđijev prelom (Fractura Monteggi)
_____
(kombinacija preloma ulne sa iščašenjem glavice radijusa u proksimalnom radioulnarnom zglobu)

Pitanje broj 29
Kod preloma prednjeg sprata baze lobanje karakteristični simptom je:
otoreja
pojava likvora kroz nos B
pojava likvora u ždrelu

Pitanje broj 30
Napeta i uvećana žučna kesa (Kurvoazijeov znak) je prisutna kod
_____
(karcinoma glave pankreasa)

Pitanje broj 31
U odnosu na lokalizaciju povrede mokraćne bešike mogu biti:
_____
(intraperitonealne i retroperitonealne)

Pitanje broj 32
U nastanku bilijarnog ileusa važnu ulogu imaju:
a) akutne upale žučne kese
b) biliodigestivne fistule B
c) opstrukcija holedohusa
d) akutni holecistopankreatitisi

Pitanje broj 33
Kod penetrantnih povreda dolazi do:
_____
(otvaranja telesnih šupljina)

Pitanje broj 34
Ileusi izazvani karcinomom kolona spadaju u grupu:
a) opturacionog ileusa A
b) strangulacionog ileusa
c) paralitičkog ileusa
d) spastičkog ileusa

Pitanje broj 35
Kod Littreove hernije postoji:
a) inkarceracija sa potpunim prestankom pasaže sadržaja
b) inkarceracija zida creva bez kompletne opstrukcije
c) inkarceracija omentuma
d) inkarceracija Meckelovog divertikuluma D

Pitanje broj 36
Seminom je maligni tumor:
a) prostate
b) bubrega
c) mokraćne bešike
d) testisa D

Pitanje broj 37
Hipertrofična stenoza pilorusa predstavlja
_____
(urođenu anomaliju želuca)

Pitanje broj 38
Punkcija mokraćne bešike je hitna intervencija koja se primenjuje:
a) kod akutne retencije mokraće A
b) kod nefrolitijaze
c) kod dizurije
d) kod anurije

Pitanje broj 39
Šarkoov (Charcot) trijas (temperatura, žutica, bol) karakteristika su:
a) holedoholitijaze
b) holecistitisa
c) pankreatitisa
d) holangitisa D

Pitanje broj 40
Kod Bazedovljeve bolesti postoji:
a) normalno lučenje hormona štitne žlezde
b) smanjeno lučenje hormona štitne žlezde
c) povećano lučenje hormona štitne žlezde C

Pitanje broj 41
Luxatio recens predstavlja
_____
(sveže iščašenje zgloba)

Pitanje broj 42
Merzeburški trijas kod Graves-Bazedovljeve bolesti čne:
_____
(egzoftalmus, struma, tahikardija)

Pitanje broj 43
Koje krvarenje najčešće nastaje kod ruptura aneurizmi u mozgu?
_____
(subarahnoidalno krvarenje)

Pitanje broj 44
Za karcinome lokalizovane na desnom kolonu jedan od najznačajnijih simptoma je:
a) anemija A
b) opstrukcija
c) povraćanje
d) tenezmi

Pitanje broj 45
Ductus arteriosus persistens (Botali) je urođena srčana mana koju karakteriše:
_____
(komunikacija između aorte i arterije pulmonalis)

Pitanje broj 46
Pasivna imunizacija organizma se postiže:
a) primenom seruma A
b) primenom antibiotika
c) primenom sulfonamida
d) primenom vakcina

Pitanje broj 47
Blair II transplntat predstavlja
_____
(kožni transplantat debljine 3/4 kože)

Pitanje broj 48
Antirabična zaštita se primenjuje kod:
_____
(kod ujeda životinja koje prenose besnilo)

Pitanje broj 49
Rovsingov znak je karakterističan:
a) kod akutnog pankreatitisa
b) kod akutnog gastritisaitisa
c) kod akutnog apendicitisa C
d) kod akutnog holecistitisa

Pitanje broj 50
Aktivna imunizacija organizma se postiže:
_____
(primenom vakcina)

Pitanje broj 51
Kongenitalni megakolon (Mb. Hirschprung) nastaje zbog
_____
(agenezije parasimpatičkih ganglija Aerbahovog pleksusa)

Pitanje broj 52
Ileus izazvan kamenom iz žučne kese spada u grupu.
_____
(opturacionog ileusa)

Pitanje broj 53
Tamponada mokraćne bešike je:
a) prepunjenost bešike mokraćom
b) prepunjenost bešike krvlju i koagulima B
c) prepunjenost bešike tamponima

Pitanje broj 54
Parestezije, neuralgije, slabost u ruci i atrofija mišića šake kod vratnog rebra su posledica pritiska vratnog rebra na:
a) a. i v. aksilaris i pleksus brahijalis
b) a. i v. subklaviju i n. aksilaris
c) a. i v. subklaviju i pleksus brahialis C
d) a. i v. aksilaris

Pitanje broj 55
Dobru podlogu razvoja anaerobnih infekcija pružaju:
a) posekotine
b) ubodne rane B
c) smrskotine
d) nagnječine

Pitanje broj 56
Sterilizacija etilen oksidom spada u grupu:
a) hemijske sterilizacije
b) savremenih metoda sterilizacije B
c) sterilizacije suvom toplotom
d) sterilizacije vlažnom toplotom

Pitanje broj 57
Postoperativni period obuhvata:
a) vreme od završetka operacije do ozdravljenja A
b) vreme od završetka operacije do otpuštanja kući
c) vreme provedeno u bolnici
d) vreme provedeno u intenzivnoj nezi

Pitanje broj 58
Paronichia predstavlja:
a) gnojno zapaljenje znojnih žlezda
b) lokalnu akutnu difuznu infekciju rastresitog vezivnog tkiva
c) gnojno zapaljenje potkožnog tkiva prstiju šake
d) gnojno zapaljenje ležišta nokta D

Pitanje broj 59
Za karcinome lokalizovane na levom kolonu
jedan od najznačajnijih simptoma je:
a) anemija
b) opstrukcija B
c) povraćanje
d) tenezmi

Pitanje broj 60
Ulkusna bolest se može javiti:
a) u Meckelovom divertikulumu A
b) na pankreasu
c) na ileumu i debelom crevu
d) u biliopankreatičnim kanalima

Pitanje broj 61
Kod pravih aneurizmi:
a) nalazimo sve slojeve arterijskog zida A
b) zid čini fibrozna kapsula obložena endotelom
c) nalazimo sve slojeve venskog zida
d) dolazi do prodora krvi kroz rascep na intimi

Pitanje broj 62
Uzrok hilotoraksa je povreda
a) pulmonalne arterije
b) aorte
c) vene kave
d) duktusa toracikusa D

Pitanje broj 63
Epiduralni hematom je krvarenje:
a) ispod tvrde moždane opne
b) u parenhimu mozga
c) između kosti i tvrde moždane opne C
d) u komorama mozga

Pitanje broj 64
Akutno začepljenje lumena arterije kod embolija
mogu izazvati sledeće materije:
_____
(tromb, vazduh, masne kapljice, maligne ćelije)

Pitanje broj 65
Najčešća lokalizacija Kronove bolesti je:
_____
(terminalni deo ileuma)

Pitanje broj 66
Kušingov sindrom (Syndroma Cushing) predstavlja
skup kliničkih manifestacija koje nastaju zbog;
a) povišene sekrecije glikokortikoida A
b) povišene sekrecije kateholamina
c) smanjene sekrecije androgena
d) smanjene sekrecije kortizola

Pitanje broj 67
Hidroadenitis predstavlja

_____
(hronično zapaljenje apokrinih-znojnih žlezda)

Pitanje broj 68
Distributivni šok nastaje prvenstveno

_____
(usled velikog poremećaja preraspodele krvi)

Pitanje broj 69
Marphyev znak je karakterističan kod:
a) karcinoma glave pankreasa
b) akutnog holecistitisa B
c) hroničnog holecistitisa
d) karcinoma hilusa jetre

Pitanje broj 70
Haemorrhagia per diapedesin nastaje zbog:
a) oštećenja krvnog suda patološkim procesom
b) mehaničke povrede krvnih sudova
c) poremećaja propustljivosti krvnih sudova C
d) povećanog arterijskog pritiska

Pitanje broj 71
Kod potresa mozga (commotio cerebri) postoje:
a) patoanatomske promene mozga
b) funkcionalne promene mozga B
c) patoanatomske i funkcionalne promene mozga
d) nema promena na mozgu

Pitanje broj 72
U slučaju tamponade srca punkcija perikarda:
a) je vitalna indikacija A
b) može se uraditi s drugim terapeutskim sredstvima
c) nije obavezna
d) nije potrebna jer se tamponada srca leči operativno

Pitanje broj 73
Najčešći uzrok nastanka akutnog medijastinitisa je:

_____
(perforacija jednjaka)

Pitanje broj 74
Pertes-Brownov sindrom se javlja kod:
a) preloma rebara
b) kompresije grudnog koša B
c) tamponade srca
d) „torakalnog kapka“

Pitanje broj 75
Trijaža je postupak :

_____
(razvrstavanje povređenih i obolelih u odgovarajuće grupe redova hitnosti čime se obezbeđuje prvenstvo u zbrinjavanju onima čiji život zavisi od hitnosti pružanja neophodne medicinske pomoći)

Pitanje broj 76
Kod kontuzije mozga postoje:
e) patoanatomske promene mozga A
f) funkcionalne promene mozga
g) patoanatomske i funkcionalne promene mozga
h) nema promena na mozgu

Pitanje broj 77
Ginekomastija je:

_____
(hipertrofija dojke kod muškarca)

Pitanje broj 78
Komplikacije ulkusne bolesti su

_____
(krvarenje, perforacija, stenoza, penetracija, m.alteracija)

Pitanje broj 79
Penetrantne povrede grudnog koša su one povrede kod kojih postoji:
a) povrede zida koša sa zatvorenim prelomom rebara
b) povrede plućnog parenhima
c) povrede zida i komunikacija sa pleuralnim prostorom C
d) povrede kod kojih postoji prisustvo krvi u pleuralnom prostoru

Pitanje broj 80
Penetrantne lezije hilusa slezine se zbrinjavaju:
a) suturom
b) resekcijom slezine
c) konzervativno
d) splenektomijom D

Pitanje broj 81
Abdominalna punkcija se najčešće izvodi:
a) iznad simfize
b) u levom donjem kvadrantu na spoju donje i srednje trećine Monro-Richterove linije B
c) u Mc Burnievoj tački
d) u Lanzovoj tački

Pitanje broj 82
Kod povređenih koji nisu potpuno imunizovani protiv tetanusa, antitetanusna zaštita je obavezna:
a) kod svih povreda
b) kod kraš sindroma
c) kod zatvorenih povreda
d) kod svih otvorenih povreda D

Pitanje broj 83
Penetrantne lezije hilusa bubrega se zbrinjavaju:
a) suturom
b) nefrektomijom B
c) resekcijom bubrega
d) konzervativno

Pitanje broj 84
Multipne povrede se su one:
a) gde je jedan organ povređen na više mesta A
b) gde isti etiološki faktor povređuje dve različite regije ili sistema
c) gde su povrede izazvane delovanjem nekoliko etioloških faktora
d) gde je jedan organ povređen na jednom mestu

Pitanje broj 85
Kod povrede a. meningicae mediae nastaje:
a) intraventrikularno krvarenje
b) subarahnoidalno krvarenje
c) epiduralni hematom C
d) subduralni hematom

Pitanje broj 86
Kod vodenog (*water)* blasta dominiraju:
a) povrede centralnog nervnog sistema
b) povrede kostiju donjih ekstremiteta i kičmenog stuba
c) povrede abdominalnih organa C
d) povrede respiratornog sistema

Pitanje broj 87
Za određivanje procenta opečene površine kod dece mlađe od 10 godina koristi nam šema koju su dali:

_____
(Lund i Brower)

Pitanje broj 88
Kod tangencijalne rane projektilom
a) postoji samo ulazna rana sa zaostalim projektilom u kanalu;
b) putanja projektila je paralelna sa telom a rana ima oblik žleba B
c) postoji ulazna i izlazna rana spojene strelnim kanalom
d) postoje nepravilni i veliki defekti kože

Pitanje broj 89
Početni bolovi kod appendicitisa lokalizovani su:
a. u ileocekalnoj regiji
b. u epigastrijumu
c. u predelu oko pupka C
d. po celom trbuhu

Pitanje broj 90.
Najteža komplikacija perforacije apendiksa je:
a) krvarenje
b) difuzni peritonitis B
c) sekundarni ileus
d) periapendikularni infiltrat

Pitanje broj 91
Najčešća komplikacija ulkusne bolesti je:
a) perforacija
b) penetracija
c) stenoza
d) krvarenje D

Pitanje broj 92
Inkarceracija spada u grupu
paralitičkog ileusa
opturacionog ileusa
strangulacionog ileusa C
spastičkog ileusa

Pitanje broj 93
Athezije mogu biti uzroci nastanka:
a) opturacionog ileusa
b) strangulacionog ileusa
c) dinamićkog ileusa
d) opturacionog i strangulacionog ileusa D

Pitanje broj 94
Combustio je opekotina nastala dejstvom:
pare i vrelih tečnosti
hemijskih sredstava
plamena i vrelih predmeta C
električnom strujom

Pitanje broj 95
Causoma je opekotinska povreda nastala dejstvom:
a) pare i vrelih tečnosti
b) hemijskih sredstava B
c) plamena i vrelih predmeta
d) električnom strujom

Pitanje broj 96
Wallace-ovo „pravilo devetke“ kod opekotina služi za određivanje
a) a) procenta opečene površine A
b) dubine oštećenja
c) težine opekotine
d) dužine i načina lečenja

Pitanje broj 97
„Pravilo dlana“ koje se koristi za određivanje procenta opečene površine iznosi:
a) 5%
b) 2%
c) 1,5%
d) d) 1% D

Pitanje broj 98
Wallace-ovo „pravilo devetke“ validno je za određivanje procenta opečene površine kod:
a) odraslih
b) odraslih i dece preko 10 godina života B
c) odraslih i dece preko 5 godina života
d) dece

Pitanje broj 99
Prema Lound-Brower-ovoj šemi za određivanje procenta opečene površine kod dece glava i vrat odojčeta iznose:
a) 18% pa se sa svakom godinom do 10 godine smanjuje za 1% A
b) 13% pa se sa svakom godinom do 10 povećava za 0,5%
c) 9% i ne menja se u toku rasta
d) 1% pa se sa svakom godinom do 10 godine povećava za 1%

Pitanje broj 100
Prema Lound-Brower-ovoj šemi za određivanje procenta opečene površine kod dece noga odojčeta iznosi:
a) 18% pa se sa svakom godinom do 10 godine smanjuje za 1%.
b) 13% pa se sa svakom godinom do 10 godine povećava za 0,5% B
c) 18% i ne menja se u toku rasta
d) 9% pa se sa svakom godinom do 10 godine povećava za 1%

Pitanje broj 101
Stepen oštećenja kože kod opekotina obrnuto je proporcionalan:
a) jačini toplotnog izvora i dužini dejstva toplote A
b) jačini toplotnog izvora i načina povređivanja
c) dužini dejstva toplote i anatomske strukture kože
d) dužini dejstva toplote i uzrasta

Pitanje broj 102
Opekotina prvog stepena se klinički manifestuje:
a) vlažnom i otečenom kožom sivo beličaste boje
b) vlažnom kožom crvene boje sa pojavom plikova (bula)
c) crvenilom, edemom i bolno osetljivom kožom C
d) tamnosmeđom prebojenosti kože u vidu eshare

Pitanje broj 103
Opekotina drugog površnog II-a stepena se klinički manifestuje:
a) vlažnom i otečenom kožom sivo beličaste boje
b) vlažnom kožom crvene boje sa pojavom plikova (bula) B
c) crvenilom, edemom i bolno osetljivom kožom
d) tamnosmeđom prebojenosti kože u vidu eshare

Pitanje broj 104
Opekotina drugog dubokog II-b stepena se klinički manifestuje:
a) vlažnom i otečenom kožom sivo beličaste boje A
b) vlažnom kožom crvene boje sa pojavom plikova (bula)
c) crvenilom, edemom i bolno osetljivom kožom
d) tamnosmeđom prebojenosti kože u vidu eshare

Pitanje broj 105
Opekotina trećeg stepena se klinički manifestuje:
a) vlažnom i otečenom kožom sivo beličaste boje
b) vlažnom kožom crvene boje sa pojavom plikova (bula)
c) crvenilom, edemom i bolno osetljivom kožom
d) tamnosmeđom prebojenosti kože u vidu eshare D

Pitanje broj 106
Prema Jacksonu ireverzibilne promene kod opekotina gde je stepen oštećenja najveći tzv „centralna zona“ je:
a) zona nekroze A
b) zona staze
c) zona hiperemije
d) zona regeneracije

Pitanje broj 107
Kod opekotina izazvanih bazama oštećenje kože nastaje po tipu:
a) koagulacione nekroze
b) kolikvacione nekroze B
c) koagulacione i kolikvacione nekroze
d) ne dolazi do nekroze kože

Pitanje broj 108
Kod opekotina izazvanih kiselinama oštećenje kože nastaje po tipu:
a) koagulacione nekroze A
b) kolikvacione nekroze
c) koagulacione i kolikvacione nekroze
d) ne dolazi do nekroze kože

Pitanje broj 109
„Belezi“ su lokalne promene koje nastaju kod opekotina električnom strujom izazvanom:
a) električnim lukom
b) kontaktom B
c) električnim bljeskom
d) zapaljenjem odeće

Pitanje broj 110
Akutni bulozni radiodermatitis nastaje izlaganjem zračenju od:
a) 4-8Gy
b) 8-12Gy B
c) 12-15Gy
d) 15-18Gy

Pitanje broj 111
Najteži stadijum hroničnog radiodermatitisa javlja se u obliku:
a) kožne atrofije
b) kožne distrofije
c) kasne radionekroze
d) karcinoma kože D

Pitanje broj 112
Konzervativno lečenje opekotina zatvorenim metodom
podrazumeva upotrebu petoslojnog:
a) adherentnog zavoja
b) adsorptivnog zavoja
c) absorptivnog zavoja C
d) alginate zavoja

Pitanje broj 113
Operativno lečenje opekotina II-b stepena najčešće se izvodi primenom:
a) tangencijalne ekscizije A
b) nekrektomije
c) esharotomije
d) incizije

Pitanje broj 114
Smrzotine nastaju kao posledica izlaganja tela hladnoći u nepovoljnim
uslovima u toku najmanje 7 sati pri temperaturi ispod:
a) $0^{o}C$
b) $-12^{o}C$
c) $+12^{o}C$ C
d) $+4^{o}C$

Pitanje broj 115
Promrzline najčešće nastaju na:
a) šakama
b) licu
c) stopalima C
d) trupu

Pitanje broj 116
Senilna keratoza predstavlja:
a) benigni tumor kože
b) maligni tumor kože
c) prekancersku epitelnu leziju C
d) dermatozu

Pitanje broj 117
Najčešća forma bazocelularnog karcinoma kože je:
a) superficijalna
b) noduloulcerozna B
c) sklerozantna
d) pigmentna

Pitanje broj 119
Margolini-jev karcinom je po histološkom tipu najčešće:
a) bazocelularni karcinom
b) melanom
c) planocelularni karcinom C
d) sarkom

Pitanje broj 120
Najčešči oblik melanoma kože je:
a) superficijalni A
b) nodularni
c) akralni
d) lentigo

Pitanje broj 121
Melanom kože kod muškaraca se javlja najčešće na:
a) glavi
b) trupu B
c) šaci
d) nogama

Pitanje broj 122
U dijagnostici melanoma kože važan je kriterijum:
a) ABCDE A
b) ABCDEF
c) ABCDEFG
d) ABCDEFGH

Pitanje broj 123
Lipom je benigni tumor poreklom od kog tkiva:
a) mišićnog
b) masnog B
c) nervnog
d) koštanog

Pitanje broj 124
Aterom je:
a) sebacealna cista A
b) epidermoidna cista
c) dermoidna cista
d) pilozna cista

Pitanje broj 125
Maligni ekrini porom je tumor adneksa kože poreklom od:
a) dlačinog folikula
b) znojnih žlezdi B
c) lojnih žlezdi
d) nokta

Pitanje broj 126
Rabdomiosarkom je maligni tumor poreklom od:
a) poprečno prugastog mišićnog tkiva A
b) glatkog mišićnog tkiva
c) vezivnog tkiva
d) masnog tkiva

Pitanje broj 127
Tirsch-ov transplantat je transplantat parcijalne debljine kože:
a) ½ debljine
b) ¼ debljine B
c) ¾ debljine
d) 2/3 debljine

Pitanje broj 128
Lokalni kožni režnjevi prema načinu pomeranja mogu biti:
a) rotacioni, transpozicioni, klizajući i interpolirajući A
b) random, aksijalni
c) mikrovaskularni
d) muskulokutani

Pitanje broj 129
Najčešće upotrebljivani režanj za rekonstrukciju dojke je poreklom od:
a) rektusa abdominisa
b) latisimusa dorsi B
c) seratusa
d) gluteusa maximusa

Pitanje broj 130
Wolffe transplantat je transplantat kože:
a) ¼ debljine
b) ½ debljine
c) pune debljine C
d) ¾ debljine

Pitanje broj 131
Ksenotransplantati su poreklom od:
a) životinja A
b) čoveka
c) biljka
d) veštačkih materijala

Pitanje broj 132
Autotransplantacija kože je transplantacija:
a) u okviru iste biološke vrste
b) sa životinje na čoveka
c) sa kadavera
d) i davalac i primalac su ista osoba D

Pitanje broj 133
Otapoplastika je hiruška procedura korekcije:
a) nosa
b) lica
c) ušiju C
d) grudi

Pitanje broj 134
Augmentaciona mamoplastika je hiruška procedura:
a) povećanja dojki A
b) smanjenja dojki
c) podizanja dojki
d) spuštanja dojki

Pitanje broj 135
Afagija je:
a) otežano gutanje
b) nemogućnost gutanja B
c) bolno gutanje
d) povraćanje

Pitanje broj 136
Kod preloma srednjeg sprata baze lobanje karakteristični simptom je
a) otoreja A
b) likvoreja
c) pojava likvora u ždrelu
d) hematom u vidu naočara

Pitanje broj 137
Periorbitalni hematom je karakterističan
a) kod preloma zadnjeg sprata baze lobanje
b) kod impresivnih fraktura svoda lobanje
c) kod preloma prednjeg sprata baze lobanje C
d) kod svih preloma lobanje praćenim epiduralnim hematomom

Pitanje broj 138
Epiduralni hematom se najčešće javlja kao posledica
a) rupture aneurizmi
b) povreda vena u mozgu
c) poremećaja oticanja likvora u komorama
d) frakture skvame temporalne kosti D

Pitanje broj 139
Hidrocefalus predstavlja povećanje moždane tečnosti u
_____
(sistemu komora ili u subarahnoidalnom prostoru ili u oba prostora)

Pitanje broj 140
Prema kliničkom toku subduralni hematomi mogu biti
_____
(akutni do 3 dana, subakutni od 4-21 i hronični posle 21 dana)

Pitanje broj 141
Vrednosti GCS kod srednje teških kraniocerebralnih povreda iznosi
a) 9-12 A
b) 13-15
c) 5-8
d) ispod 5

Pitanje br. 142
Dekompresivna osteoplastična trepanacija se izvodi kod:
a) impresivnog preloma lobanje A
b) preloma baze lobanje
c) fisure lobanje
d) linearnog preloma lobanje

Pitanje br. 143
Perthes – Braunov sindrom nastaje kod:
a) kontuzije grudnog koša
b) kompresije grudnog koša B
c) komocije grudnog koša

Pitanje br. 144

Hematopneumotoraks je prisustvo:

a) krvi u plućnom parenhimu
b) vazduha u pleuralnom prostoru
c) krvi i vazduha u plućnom parenhimu
d) krvi i vazduha u pleuralnom prostoru D

Pitanje br. 145
Penetrantne povrede grudnog koša su one povrede kod kojih postoji:
a) povreda torakalnog zida sa prelomom rebara
b) povreda pluća
c) povreda torakalnog zida i komunikacija sa pleuralnim prostorom C
d) povrede kod kojih postoji prisustvo krvi u pleuralnom prostoru

Pitanje br. 146
Pancoast sindrom koga karakteriše intenzivan bol u gornjim ekstremitetima je posledica karcinoma pluća lokalizovanog:
a) u apeksu pluća A
b) centralno
c) u donjim partijama pluća
d) u oba plućna krila

Pitanje br. 147
Empijem pleure predstavlja prisustvo gnoja:
a) u plućima
b) u pleuri B
c) u pleuri i plućima

Pitanje br. 148
Mezoteliomi su tumori:
a) medijastinuma
b) pleure B
c) pluća
d) rebara

Pitanje br. 149
Morbus Pott predstavlja:

_____
(tuberkulozni spondilitis)

Pitanje br. 150
Haemorrhagia per diabrosin nastaje zbog:
a) oštećenja krvnog suda patološkim procesom A
b) mehaničke povrede krvnih sudova
c) poremećaja propustljivosti krvnih sudova
d) povećanog arterijskog pritiska

Pitanje br. 151
Parestezije, neuralgije, slabost u ruci i atrofija mišića šake kod vratnog rebra su posledica pritiska vratnog rebra na:
a) a) i v. subklaviju i pleksus brahijalis A
b) i v. aksilaris i pleksus brahijalis
c) i v. subklaviju i n. aksilaris

Pitanje br. 152
Najčešći benigni tumor dojke je:
a) adenoma purum
b) papilom
c) fibroadenom C
d) ipom

Pitanje br. 153
Karcinom dojke kod žena najčešće je lokalizovan u:
a) gornjem medijalnom kvadrantu
b) gornjem lateralnom kvadrantu B
c) donjem laterlanom kvadrantu
d) donjem medijalnom kvadrantu

Pitanje br. 154
Bronhoskopija predstavlja:
a) metodu ispitivanja traheje i bronhijalnog stabla pomoću endoskopa A
b) metodu rendgenskog ispitivanja bronhijalnog stabla pomoću kontrasta
c) metodu posmatranja redgenskog nalaza bronhijalnog stabla na ekranu

Pitanje br. 155

Karcinomi dojke daju najčešće metastaze:
a) u aksilarnim limfnim žlezdama A
b) u infraklavikularnim žlezdama
c) u plućima
d) na kostima

Pitanje br. 156

Za nastajanje sekundarnih bronhiektazija neophodna su dva osnovna faktora koji prethodno evoluiraju u zdravom plu-nom parenhimu, a to su:
a) stagnacija sekreta i infekcije A
b) opstrukcija i stagnacija sekreta
c) infekcija i opstrukcija

Pitanje br. 157
Absces pluća je:
a) difuzno gnojno zapaljenje plućnog parenhima
b) ograničena gnojna kolekcija bronhijalnog stabla
c) ograničena gnojna kolekcija plućnog parenhima C

Pitanje br. 158
Taloženje sputuma u tri sloja: gornji sluzav, srednji serozan i donji gnojavo kašast karakteristično je za:
a) absces pluća
b) bronhiektazije B
c) bronhopneumonije

Pitanje br. 159
Tortikolis je anomalija u razvitku:
a) sternokleidomastoidnog mišića A
b) skalenusnih mišića
c) trapezastog mišića

Pitanje br. 160
Najčešći uzrok nastanka akutnog medijastinitisa je:
a) širenje infekcije iz vrata
b) perforacija jednjaka B
c) širenje infekcije iz pluća
d) povreda grudnog koša

Pitanje br. 161

Jedan od uzroka hilotoraksa je povreda:
a) pulmonalne arterije
b) aorte
c) vene kave
d) duktusa toracikusa D

Pitanje br. 162
Terapija pneumotoraksa sastoji se u:
a) torakotomiji
b) interkostalnoj drenaži B
c) konzervativnom tretmanu

Pitanje broj 163
Atelija je anomalija dojke kod koje postoji:
a) prekobrojno tkivo dojke
b) odsustvo dojke
c) odsustvo bradavice C
d) hipoplazija dojke

Pitanje broj 164
Padžetova (Paget) bolest predstavlja
a) inflamatorno oboljenje dojke
b) gljivično oboljenje dojke
c) benigni tumor dojke
d) karcinom dojke D

Pitanje broj 165
Kod tetralogije Fallot postoje sledeće anomalije

(Dekstropozicija aorte, Ventrikularni septalni defekt (VSD), Stenoza ili atrezija plućne arterije, Hipertrofija desne komore)

Pitanje broj 166
Kastracija je:
a) odstranjenje penisa
b) odstranjenje oba testisa B
c) odstranjenje penisa i testisa

Pitanje broj 167
Radikalna prostatektomija je:
a) operacija za benignu hipertrofiju prostate
b) operacija za Ca prostate B
c) operacija za tumore bešike

Pitanje broj 168
Radikalna cistektomija je
a) operacija za proliferativni tumor bešike
b) operacija za infiltrativni tumor bešike B
c) operacija odstranjivanja ciste

Pitanje broj 169
Radikalna orhidektomija je
a) operacija u hormonskom tretmanu Ca prostate
b) operacija za spuštanje testisa
c) operacija tumora testisa C

Pitanje broj 170
TURP znači
a) tradicionalna urološka radikalna prostatektomija
b) trajna urološka rustična palijacija
c) transuretralna resekcija prostate C

Pitanje broj 171
Urinarna staza znači:
a) zastoj u oticanju mokraće A
b) zastoj u oticanju krvi
c) stanje u urotraktu

Pitanje broj 172
Kako nastaje urosepsa?
_____
(prodorom bakterija i toksina u krvotok iz urotrakta)

Pitanje broj 173
Anurija je:
a) nemogućnost mokrenja
b) nedolazak urina u mokraćnu bešiku B
c) prestanak rada bubrega

Pitanje broj 174
Ren unus je:
a) jedan funkcionalan bubreg
b) jedan nefunkcionalan bubreg
c) jedan postojeći bubreg C

Pitanje broj 175
Uretritis je:
a) zapaljenje mokraćovoda
b) zapaljenje bubrežne karlice
c) zapaljenje mokraćne cevi C

Pitanje broj 176
Koja se od navedenih grana urologije bavi muškim infertilitetom?
a) endourologija
b) andrologija B
c) uroginekologija
d) uroloska propedevtika

Pitanje broj 177
Razlika anurije i retencije mokraće je:
a) kod anurije je bešika prazna, a kod retencije ima malo mokraće u njoj
b) nema razlike
c) kod anurije je bešika puna, a kod retencije je prazna
d) kod anurije je bešika prazna,a kod retencije je prepunjena D

Pitanje broj 178
Hemospermija je:
a) prisustvo sperme u krvi
b) prisustvo urina u spermi
c) prisustvo krvi u spermi C
d) odsustvo krvi iz sperme

Pitanje broj 179
Kada je neophodna kateterizacija mokraćne bešike:
a) retencija urina A
b) polakiurija
c) dizurija
d) strangurija

Pitanje broj 180
Krvarenje iz uretre se naziva:
a) uretritis
b) ureteritis
c) uretrostomija
d) uretroragija D

Pitanje broj 181
Serumski PSA antigen služi za otkrivanje:
a) ehinokokusa urotrakta
b) benigne hiperplazije prostate
c) adenokarcinoma prostate C
d) karcinoma muške dojke

Pitanje broj 182
Derivacija urina je:
a) odvođenje urina kateterima i sondama
b) dovođenje urina u mokraćnu bešiku
c) razvođenje urina u bešiku i van nje
d) odvođenje urina posle odstranjivanja mokraćne bešike D

Pitanje broj 183
Šta je Parafimoza (Paraphimosis)?
_____
(Parafimoza je stanje kada povučeni prepucijum preko glansa penisa
ne može da se vrati u normalan položaj)

Pitanje broj 184
Benigna hiperplazija prostate (BHP) pogađa:
a) i muškarce i žene
b) češće muškarce nego žene
c) muškarce srednje životne dobi
d) uglavnom starije muškarce D

Pitanje broj 185
Stari, pogrešan naziv za erektilnu disfunkcju je bio:
a) prijapizam
b) dispareunija
c) impotencija C
d) prevremena ejakulacija

Pitanje broj 186
Spinalna anestezija nastaje ubrizgavanjem lokalnog anestetika u:
a) subarahnoidalni proctor A
b) epiduralni prostor
c) periduralni prostor

Pitanje broj 187
Prilikom davanja periduralne anestezije:
a) probijamo duru mater (tvrdu moždanicu)
b) ne smemo probiti duru mater (tvrdu moždanicu) B

Pitanje broj 188
Periduralni prostor je ispunjen:
a) likvorom
b) vazduhom B

Pitanje broj 189
Hipotenzija je česta komplikacija:
a) epiduralne anestezije
b) spinalne anestezije B

Pitanje broj 190
Za sedaciju koristimo najčešće sledeće lekove:
a) miorelaksante
b) benzodijazepine B
c) antisijalogogne lekove

Pitanje broj 191
Halotan je:
a) barbiturat ultra kratkog dejstva
b) inhalacioni anestetik B
c) mišićni relaksant
d) analgetik

Pitanje broj 192
Fentanyl je:
a) barbiturat ultra kratkog dejstva
b) inhalacioni anestetik
c) mišićni relaksant
d) analgetik D

Pitanje broj 193
Opijatni analgetici izazivaju:
a) miozu A
b) midrijazu

Pitanje broj 194
Antagonist nedepolarizantnih mišićnih relaksanata je:
a) Anexate
b) Naloxon
c) Neostigmin (Prostigmin) C

Pitanje broj 195
Endotrahealni tubus prilikom intubacije češće zapada u:
a) desni bronh A
b) levi bronh

Pitanje broj 196
Za plasiranje laringealne maske
a) neophodan nam je laringoskop
b) nije nam neophodan laringoskop B

Pitanje broj 197
Laringealna maska
a) obezbeđuje disajni put u slučaju regurgitacije i povraćanja
b) ne obezbeđuje disajni put u slučaju regurgitacije i povraćanja B

Pitanje broj 198
Centralni venski kateter (CVK) plasira se tako da njegov vrh bude u:
a) v. subclavii
b) v. jugularis ext.
c) v. jugularis. int.
d) desnoj pretkomori D

Pitanje broj 199
Normalne vrednosti centralnog venskog pritiska (CVP) su:
a) 0-3 cmH_2O
b) 3-10 cmH_2O B
c) preko 10 cmH_2O
d) preko 20 cmH_2O

Pitanje broj 200
Kod odraslih normalna diureza je:
a) 20 ml/h
b) 30 ml/h
c) 50 ml/h C
d) 5 ml/kg/h

Pitanje broj 201
Normalna zasićenost hemoglobina kiseonikom je:
a) 88-92%
b) 90-95%
c) 95-100% C

Pitanje broj 202
Anafilaktički šok je oblik:
a) hipovolemijskog šoka
b) opstruktivnog šoka
c) distributivnog šoka C
d) medikamentoznog šoka

Pitanje broj 203
Kod srednje teškog oblika hipovolemijskog šoka postoji gubitak od:
a) 10-20% cirkulatornog volumena
b) 20-40% cirkulatornog volumena B
c) više od polovine cirkulatornog volumena

Pitanje broj 204
U kardiogenom šoku dominira:
a) hipotenzija A
b) hipertenzija

Pitanje broj 205
U stanju šoka dolazi do teških poremećaja metabolizma koji se manifestuju:
a) metaboličkom acidozom A
b) metaboličkom alkalozom

Pitanje broj 206
Znaci neurogenog šoka su:
a) hipotenzija, tahikardija, poremećaj svesti i oligurija
b) hipertenzija, bradikardija, poremećaj svesti i oligurija
c) hipotenzija, bradikardija, poremećaj svesti i oligurija C

Pitanje broj 207
Rastvor Ringer-laktat pripada grupi:
a) kristaloidnih rastvora A
b) koloidnih rastvora

Pitanje broj 208
U slučaju hipovolemijskog šoka treba (u odnosu na procenjeni gubitak krvi) dati:
a) istu količinu kristaloidnih rastvora
b) dva puta veću količinu kristaloidnih rastvora B
c) tri puta veću količinu kristaloidnih rastvora

Pitanje broj 209
Rastvor 5% Glukoze je u odnosu na krv:
a) izotoničan
b) hipotoničan B
c) hipertoničan

Pitanje broj 210
Anafilaksa je generalizovana reakcija koja nastaje posredstvom:
a) IgG i IgM antitela
b) IgE antitela B
c) komplementa

Pitanje broj 211
Anafilaktička reakcija nastaje:
a) kod prethodno senzibilisane osobe A
b) prilikom prvog kontakta sa alergenom

Pitanje broj 212
U kliničkoj slici anafilaktičkog šoka dominiraju:
a) hipertenzija, bronhospazam, vazodilatacija, povećana propustljivost krvnih sudova
b) hipotenzija, bronhodilatacija, nastanak edema i promene na koži (urtikarija)
c) hipotenzija, laringospazam, bronhospazam, povećana propustljivost krvnih sudova C

Pitanje broj 213
Inhibicija sekrecije disajnih puteva i pljuvačnih žlezdi postiže se davanjem:
a) Adrenalina
b) Atropina B
c) Amfetamina

Pitanje broj 214
U slučaju pojave angioneurotskog (Quincke-ovog) edema koji preti da ugrozi disajni put:
a) treba odmah dati adrenalin i pozvati tim za reanimaciju
b) b) treba dati antihistaminik i kortikosteroid a ako ta terapija ne deluje onda treba pozvati tim za reanimaciju B

Pitanje broj 215
Da bi postavili dijagnozu anafilaktičkog šoka:
a) dovoljno je da registrujemo pojavu generalizovane urtikarije A
b) samo pojava generalizovane urtikarije nije znak anafilaktičkog šoka

Pitanje broj 216
Pacijent koji je bez svesti a diše treba da bude postavljen u:
polusedeći položaj, kako bi mu olakšali disanje
u položaj na leđima sa podignutim nogama, kako bi se pacijentu krv
usmerila ka mozgu i kako bi stimulisali ponovno uspostavljanje svesti
bočni koma položaj C

Pitanje broj 217
Kod anafilaktičkog šoka izazvanog hranom:
a) treba što pre izazvati povraćanje kako bi sprečili razvoj bifazne alergijske reakcije
b) ne treba izazivati povraćanje B

Pitanje broj 218
Po novim preporukama, u slučaju anafilaktičkog šoka, adrenalin treba dati:
intravenski
intramuskularno B
intraosealno

Pitanje broj 219
Odrasla osoba ima normalno:
a) 18-20 respiracija/min
b) 12-20 respiracija/min B
c) 24-20 respiracija/min
d) 24-30 respiracija/min

Pitanje broj 220
Arest vreme je:
vreme od nastanka akutnog zastoja srca do momenta pozivanja ekipe hitne medicinske pomoći
vreme od momenta nastanka akutnog zastoja srca do započinjanja mera KPR B
vreme od momenta nastanka akutnog zastoja srca do ponovnog uspostavljanja srčane radnje

Pitanje broj 221
Orofaringealni tubus plasiramo kako bi:
a) obezbedili disajni put od aspiracije sadržaja u slučaju regurgitacije i povraćanja
b) obezbedili prohodnost disajnog puta kod duboko komatoznih pacijenata B
c) oba odgovora su tačna

Pitanje broj 222
Mendelsonov sindrom nastaje kao posledica:
a) povrede traheje
b) bronhospazma
c) aspiracije želudačnog sadržaja C

Pitanje broj 223
Kod monofaznih defibrilatora preporučena energija za prvi defibrilacijski šok je:
a) 150-200J
b) 200-360J
c) 360 J C

Pitanje broj 224
Po novim preporukama, u toku KPR adrenalin treba dati posle:
a) prve defibrilacije
b) druge defibrilacije
c) treće defibrilacije C

Pitanje broj 225
U toku reanimacije trudnicu treba postaviti u:
a) levi bočni položaj A
b) desni bočni položaj
c) u bočni položaj-nebitno na koju stranu

Pitanje broj 226
Sindrom gornje aperture toraksa podrazumeva (**"thoracic outlet syndrome"**):
_____
(skup neurovaskularnih manifestacija zbog kompresije neurovaskularne peteljke u nivou gornje torakalne aperture)

Pitanje broj 227
Angiografija predstavlja:
a) kontrastno snimanje arterija A
b) dopler sonografija krvnih sudova
c) kontrastno snimanje vena
d) Ct krvnih sudova

Pitanje broj 228
U rekonstrukciji povređenih krvnih sudova koriste se sledeće hirurškr procedure:
_____
(direktan šav(sutura) krvnog suda; spajanje kraja sa krajem (termino-terminalna anastomoza),
"zakrpa" ("patch") krvnog suda, "umetanje" (interpozicija) vaskularnog grafta i premošćavanje (bajpas procedura)

Pitanje broj 229
Embolija je stanje koje najčešće dovodi do.
a) hronične okluzije arterija
b) disekcije arterija
c) akutne okluzije arterija C
d) hronične okluzije vena

Pitanje broj 230
U anglosaksonskoj literaturi klinička slika arterijske ishemije se opisuje
kao "five P"- pet P ili "six P"- šest P
_____
(pain – bol; pallor – bledilo, parestesias – pareza; paralysis – paraliza;
pulselessness – gubitak pulsa; poikilothermia – lokalna hladnoća)

Pitanje broj 231
Embolektomija je proces:
_____
(uklanjanja embolusa Fogartijevim kateterom)

Pitanje broj 232
Hronična ishemija ekstremiteta, po Fontenu (Fontain) prolazi kroz:
a) 2 stadijuma
b) 3 stadijuma
c) 5 stadijuma
d) 4 stadijuma D

Pitanje broj 233
Etiološki aneurizme mogu biti:
_____
(1. kongenitalne aneurizme, 2. aneurizme usled poremećaja strukture vezivnog tkiva,
3. degenerativne aneurizme, 4. infektivne aneurizme, 5. inflamatorne aneurizme,
6. disekantne aneurizme, 7. poststenotične aneurizme,
8. pseudoaneurizme, 9. aneurizme vaskularnih graftova)

Pitanje broj 234
Komplikacije aneurizmi su:
_____
(kompresija; tromboza; embolizacija; ruptura.)

Pitanje broj 235
Meckelov divertikujum je urođena anomalija koja predstavlja
_____
(zaostatak omfalomezenteričnog kanala)

Pitanje broj 236
Eructatio predstavlja:
a) povraćanje
b) muku
c) štucanje
d) podrigivanje D